

Diatrype decorticata versus *Diatrype stigma*

Flächig wachsende Eckenscheibchen werden im Feld gerne als *D. stigma* angesprochen. Es lohnt sich jedoch, genauer hinzuschauen. Auf Buche z. B. wird *D. stigma* durch die sehr ähnliche *D. decorticata* mit häufig etwas rötlich braunen und unregelmäßiger aufgerissenen Stromata ersetzt. *D. stigma* kommt bevorzugt an Eiche, Edelkastanie und Hasel vor. An Betulaceae wachsen jedoch beide Arten, was die Unterscheidung mitunter recht schwierig macht. Auf Birke sollte zudem noch auf *D. undulata* mit etwas kleineren Ascosporen und Stromata mit unregelmäßig welligem Rand geachtet werden. Für weitere Informationen siehe z. B. RAPPAZ (1987a, 1987b) oder CHLEBICKI & KRZYŻANOWSKA (1995).



Diatrype decorticata (oben) und *D. stigma* (unten). Foto: © Gernot Friebes



Diatrype undulata. Foto: © Ilse Wendelin

Lit.:

RAPPAZ, F., 1987a: Taxonomie et nomenclature de *Diatrype stigma*, *D. decorticata* et *D. undulata* (Diatrypaceae, Ascomycetes). – Mycotaxon **30**: 209–219.

(<http://www.cybertruffle.org.uk/cyberliber/59575/0030/0209.htm>)

RAPPAZ, F., 1987b: Taxonomie et nomenclature des Diatrypaceae à asques octospores. – Mycologia Helvetica **2**(3): 285–648.

CHLEBICKI, A., KRZYŻANOWSKA, J., 1995: Notes on Pyrenomycetes and Coelomycetes from Poland 3. *Diatrype subaffixa*, a new species for Europe. – Sydowia **47**(1): 10–30.

(http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/Sydowia_47_0010-0030.pdf)

Textautor: Gernot Friebes