

Klasse: *Basidiomycetes*

Gattung *Amanitopsis*

Ordnung: *Agaricales*

Familie: *Amanitaceae*

Gattung *Amanitopsis* Pers. (Scheidenstreiflinge)

Merkmale

Hutform	Hut vom Stiel leicht abtrennbar
Hutfarbe	(weiss), grau, rotbraun
Hutoberfläche	glatt, faserig, schuppig
Fleisch	dünnfleischig
Lamellen	weiss, frei
Sporenfarbe	weiss
Stiel	ohne Ring, lappige Scheide
Vorkommen	Wald

Unterschied zu *Amanita*: kein Partialvelum (d.h. „*Amanita*“ ohne Ring)

Vertreter

[keiner der folgenden Vertreter ist im Anhang 1 der Verordnung über Speisepilze (VSp) enthalten]

Gemäss Liste der Speisepilze, VAPKO 2002 wird die ganze Gruppe *Vaginaria* (Scheidenstreiflinge) der Gattung *Amanita* zu den Speisepilzen gezählt.

Beschreibung nach Moser, 5. Aufl. 1983

Die Gattung *Amanitopsis* wird bei Moser als Untergattung der Gattung *Amanita* behandelt:

Subgenus *Amanita* Sektion *Vaginaria* Forq., Scheidenstreiflinge (= *Amanitopsis* Roz.)

Beschreibung nach Svengunnar Ryman & Ingmar Holmåsén, 1992

Bei Svengunnar Ryman & Ingmar Holmåsén wird *Amanitopsis* auch unter die Gattung *Amanita* zusammengekommen. Beim Bestimmungsschlüssel heisst es zu *Amanitopsis*:

Sporen rund oder fast rund. Stielbasis mit Volva oder Volvaresten. Z.T. schwer bestimmbare Arten, die manchmal auch in eine eigene Gattung (*Amanitopsis*) gestellt werden.

Beschreibung nach Winkler, 1996

Winkler führt *Amanitopsis* ebenfalls unter der Gattung *Amanita* (**Wulstling**, **Knollenblätterpilz**, **Scheidenstreifling** *Amanita*).

Alle Scheidenstreiflinge (*Amanitopsis*) sind jedoch ohne Ring.



Abb. 1: *A. battarae*

Speisepilz



Abb. 2: *A. crocera*

Speisepilz



Abb. 3: *A. fulva*

Speisepilz

Abbildungen: Georg Müller (<http://www.pilzepilze.de/piga/>)