































































## Synopse: MILDE ARTEN

Hut	Name (SPP)	Vorkommen	Besonderheiten	Hut	Name (SPP)	Vorkommen	Besonderheiten
Weißtäublinge	camarophylla delica agg. pallidospora			Schwarzstäublinge	nigricans (Ia) albonigra (Ia) adusta (Ia) densifolia (Ia) anthracina var. insipida (Ia)		
Orange bis Rot XL   	lepida (IIa) melliolens (IIa-b) decolorans (IIc-d) paludosa (IIIa-b) faginea (IIIb-IVa) xerampelina (IIIb-c) curtipes (IIIc-IVb) alutacea (IVb-d) olivacea (IVb-d)  romellii (IVd) intermedia (IVd-e)	LW LW NW, gerne Moorwälder NW, gerne Moorwälder Rotbuchen NW LW LW, Rotbuchen LW  LW LW, Birken	Schneiden oft rötlich Honiggeruch (trocknen)  Schneiden oft rötlich Heringslake, neigt zum bräunen Heringslake, neigt zum bräunen  Schneiden oft rot; Ph rotviolett Huthaut oft konz. gerunzelt	Grau bis Braun XL  			
Orange bis Rot M   	vesca aquosa aurora/velutipes purpurata vinosa nitida aurea /aurata laeta integra			Grau bis Braun M  			
Orange bis Rot S   	emeticolor (Ia) amoena (Ib) robertii/sphagnophila melzeri purpurata versicolor font-queri nauseosa odorata cessans risigallina /chamaeleontina			Grau bis Braun S  			
Grün XL 				Blau bis Violett XL  			
Grün M 				Blau bis Violett M  			
Grün S 				Blau bis Violett S  			
Weiß bis Gelb XL  				Mehrfarbig XL 			
Weiß bis Gelb M  				Mehrfarbig M 			
Weiß bis Gelb S  				Mehrfarbig S 			

Synopse: SCHARFE / BITTERE ARTEN

Hut	Name (SPP)	Vorkommen	Besonderheiten	Hut	Name (SPP)	Vorkommen	Besonderheiten
Weißtäublinge				Schwarzstäublinge	(mäßig bis sehr scharf in Lamellen!) densifolia (1a) anthracina (1a) acrifolia (1a)		
Orange bis Rot XL  				Grau bis Braun XL  			
Orange bis Rot M  				Grau bis Braun M  			
Orange bis Rot S  				Grau bis Braun S  			
Grün XL 				Blau bis Violett XL  			
Grün M 				Blau bis Violett M  			
Grün S 				Blau bis Violett S  			
Weiß bis Gelb XL  				Mehrfarbig XL 			
Weiß bis Gelb M  				Mehrfarbig M 			
Weiß bis Gelb S  				Mehrfarbig S 