

Trüffelartige Täublinge, mild	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen S: Stiel	Farb- Reaktionen	Spp- Farbe	Notizen
<i>R. candida</i>		0,5-3,5; weißlich- gelblich-gelborange- tief orange	unklar	F: weißlich- gelblich- gelborange-tief orange; mild; geruchlos	Hymenophor: labyrinthisch, hell orange S: rudimentär, bis 1,5 X 0,4 mm, zylindrisch bis keulig, zentral bis lateral angewachsen	unklar	unklar	Fruchtkörper geschlossen bis fast geschlossen kugelig, hypogäisch bis semi-hypogäisch wachsend; Gleba orange; sehr selten
Weiß-Täublinge, mild bis mäßig scharf/bitter	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen S: Stiel	Farb- Reaktionen	Spp- Farbe	Notizen
<i>R. camarophylla</i>		4-12; weißl, gelbl, hellbräunl	trocken; matt; glatt; nicht oder am Rd abzieh	F: weiß, sehr hart und brüchig; mild; geruchlos	L creme, dick, entfernt; S: weiß, bräunend	Fe rosa (ss Galli)	weiß; la	Sehr selten; Laub- und Nadelb; Sp sehr klein, feinstwarzig mit Verbindungen; die Frk erinnern an den Trockenen Schneckling (<i>Hygrophorus penarius</i>)
<i>R. delica</i> agg.		5-18: weißl- hellbräunl	trocken; matt; glatt; nicht abzieh	F: weiß, sehr hart; F mild, L mäßig scharf ; Krabben, Hering	L : creme; S: weiß bis ocker	Fe rosa (ss Galli)	weißl- hellcreme; lb-IIa	Laub- und Nadelb; oft oberes Stielende (mitunter auch Lamellen) mit deutlichem, bläulichgrünem Schimmer
<i>R. pallidospora</i>		6-22; weiß, neigt zu gilben	trocken; matt; glatt; nicht abzieh	F: weiß, neigt zu gilben; mild bis bitterlich; fruchtig- gewürzartig	L: creme, gelbl; S: weiß bis ocker	Fe rosa (ss Galli)	intensiv creme; lld	Selten; Laubb; Kalkböden
Schwärztäublinge, mild	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: Lamellen S: Stiel	Farb- Reaktionen	Spp- farbe	Notizen, insbes. die Verfärbung bei Verletzung
<i>R. nigricans</i>		5-20; weißlich→creme →graubraun→schwarz	klebrig/glänz/glatt; nicht abzieh	F: weiß; mild oder fast mild; muffig	L creme→ braunschwarz, sehr entfernt und dick ; S: weiß→bräunl →schwärzl	Fe grün (ss Galli)	weiß; la	Frk deutl rötend, dann deutl schwärzend ; Laub- und Nadelb
<i>R. albonigra</i>		5-15; weiß→creme →braun→schwarz	klebrig/glänz/glatt; nicht abzieh	F: weiß; bitterl, dann mild (menthol-artig); geruchlos	L: weiß, dichtstehend ; S: weiß→ bräunl→schwärzl	Fe rosa (ss Galli)	weiß; la	seltene Art; Frk direkt schwärzend ; starker Schwarz-Weiß-Kontrast*); Nadelb; saure Böden

R. adusta		5-20; weiß→milchkaffeebraun→ocker→sepiabraun	klebrig/glänz/glatt; nicht abzieh	F: weiß; mild; nach Weinkeller	L: weiß→schwärzend, dichtstehend ; S: weiß→bräunl→schwärzl, Basis faltig (Wurstende)	Fe rosa, dann grün (Galli)	weiß; la	Frk schwach rötend, dann leicht bräunlich, graulich verfärbend ; Nadelb; schwach saure Böden
R. densifolia		3-10; jung 2-farbig: Mitte grau, weiter außen weißlich , alt sepiagrau	klebrig/matt/glatt; nicht abzieh	F: weiß; fast mild; muffig	L: weißl→ocker→schwarz, dichtstehend ; S: weiß→grau	Fe grün (ss Galli)	weiß; la	Frk deutl rötend, dann deutl schwärzend ; Laub- und Nadelb; saure Böden
R. anthracina var. insipida		5-12; weiß→rauchbraun→schwarz	klebrig/matt glänzend/glatt; nicht abzieh	F: weiß; Frk komplett mild ; schwach fruchtig	L: weiß mit lachsrosa Reflex, dichtstehend ; S: weiß→bräunl→schwärzl	Fe grün (ss Galli)	weiß; la	Frk direkt schwärzend ; Laub- und Nadelb; Kalkböden

Schwärz-Täublinge, scharf bis bitter	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: Lamellen S: Stiel	Farb-Reaktionen	Spp-Farbe	Notizen
R. densifolia		3-10; jung 2-farbig: Mitte grau, weiter außen weißlich , alt sepiagrau	klebrig/matt/glatt; nicht abzieh	F: weiß; mäßig scharf, insbes die L; muffig	L: weißl→ocker→schwarz, dichtstehend ; S: weiß→grau	Fe grün (ss Galli)	weiß; la	Frk deutl rötend, dann deutl schwärzend ; Laub- und Nadelb; saure Böden
R. anthracina		5-12; weiß→rauchbraun→schwarz	klebrig/matt glänzend/glatt; nicht abzieh	F: weiß; F mild, L scharf , schwach fruchtig	L: weiß mit lachsrosa Reflex, dichtstehend ; S: weiß→bräunl→schwärzl	Fe grün (ss Galli)	weiß; la	Frk direkt schwärzend ; Laub- und Nadelb; Kalkböden
R. acrifolia		5-15; weißl→blass braun→graubraun→sepiabraun→schwarz	klebrig/speckig glänz/glatt; nicht abzieh	F fast mild, L sehr scharf , geruchlos	L: weißl→creme→ocker, dichtstehend ; S: weiß→grau	Fe grün (ss Galli)	weiß; la	Frk deutl rötend, dann deutl schwärzend ; Laubb; Kalkböden

Hut orange bis rot, XL, mild	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: Reife Lamellen; S: Stiel	Farb-Reaktionen	Spp-Farbe	Notizen
R. lepida/rosacea		5-12; zinnober- bis blutrot, rosa	trocken/matt/glatt; nicht abzieh	F: weiß; sehr hart; mild- bitterlich ; Zedernholzger	L:creme, Schn oft rötlich , S: weiß bis komplett rosa o rot	Fe rosa	blass creme; IIa	Fl sehr hart; Laubb
R. melliolens		4-12; lebh rot, orange, fleischrosa, karminrot, aprikot	trocken/matt/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; beim Trocknen Honig	L: blass creme S: weiß, selten rosa behaucht	Fe rosa	blass creme; IIa-b	Sp völlig rund; Laubb

<i>R. decolorans</i>		4-12; orange, orangeroth, ziegelrot, gelborange	trocken/ glänzend/glatt; am Rd abziehbar	F: weiß, grauend; mild; geruchlos	L: creme, grauend; S: weiß, grauend	Fe rosa; Formol rosa	intensiv creme; IIc-d	Nadelb; gern Moorwälder
<i>R. paludosa</i>		7-16; orange bis hochrot, karminrot, blutrot	trocken/ stark glänzend /glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß; mild, jung L oft kurzz scharf ; geruchlos	L: hell ocker; Schn oft rötlich , S: weiß oder rosa, gerne etw grauend	Fe rosa; Formol neg	ocker; IIIa-b	Nadelb; gerne Moorwälder
<i>R. medullata</i>		4-12; immer blass: lilarosa, blass fleischfarben	klebrig/glänzend/glatt ; 1/2 abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: hell buttergelb; S: weiß	Fe rosa	IIIa-c	Laubb; Parkanlagen
<i>R. faginea</i>		6-14; wein- bis rosarot, ockerlich orange	trocken/matt/ glatt; nicht abziehbar	F: weiß, bräunend; mild; Heringslake	L: ocker; S: weiß	Fe grün	ocker-blass gelb; IIIb-IVa	Frk neigt zum Bräunen ; Rotbuchen
<i>R. xerampelina/erythropoda</i>		3-12; karminrot, purpur-, weinrot	klebrig/matt/ glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß, bräunend; mild; Heringslake	L: ocker; S: rot, weiß oder rot geflammt	Fe grün	intensiv ocker; IIIb-c	Frk neigt zum Bräunen ; Nadelb
<i>R. curtipes</i>		6-12; fleischrosa, weinrot	trocken/matt/ glatt; nicht abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: ocker S: weiß	Fe rosa; Ph braun	ocker-blass gelb; IIIc-IVb	St meist kürzer als H-Breite; Laubb
<i>R. pseudointegra</i>		3-12; sattrosa bis leuchtend kirschrot-zinnoberrot	trocken; matt; glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß; mild; fruchtig	L: gelblich S: weiß	Fe rosa; SV rot (Exs)	blass gelb; IVb	Fl jg sehr hart; Laubb (gerne Eichen)
<i>R. vinosobrunnea</i>		5,5-18; braunrot, weinrot, purpurrot, lilarot	trocken/mattglänz/ glatt; am Rd. abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: gelblich; S: weiß oder rosa überhaucht	Fe rosa; Ph rotviolett	gelb; IVb-c	Sp isoliert warzig mit kurzen Verbindungen; Laubb (Rot- und Hainbuchen, Eichen, Esskastanien)
<i>R. alutacea</i>		7-13; braunrot, purpurn, weinrot	trocken/matt/ glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: gelblich; S: weiß, manchmal basal rosa	Fe rosa; Ph rotviolett	gelb; IVb-d	Sp teilnetzartig-gratig; Laubb (Rotbuchen)
<i>R. integra</i>		5-15; blutrot, braunrot	klebrig; matt; glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: ocker; S: weiß	Fe rosa; Ph braun	gelb; IVc	Nadelb
<i>R. olivacea</i>		9-16; braunrot, weinrot	trocken/matt/ glatt; nicht abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: gelblich; Schn oft rot ; S: weiß, meist apikal rosa	Fe rosa; Ph rotviolett	gelb; IVb-d	Sp isoliert-stachelig, Hh oft konz gerunzelt , Laubb
<i>R. romellii</i>		6-13; weinrot, purpurrot, braunrot, fleischrosa	trocken/glänzend/ glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: buttergelb; S: weiß	Fe rosa; Ph braun	lebh. gelb; IVd	Laubb

Hut orange bis rot, XL, scharf bis bitter 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: Reife Lamellen; S: Stiel	Farb-Reaktionen	Spp-Farbe	Notizen
--	--------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	------------------	----------------

<i>R. amarissima</i>	6-15; lederrot, dunkel karminrot, dunkel braun- bis purpurrot	trocken/matt/ glatt; nicht abzieh	F: weiß; sehr bitter ; schwach fruchtig	L: creme (bräunlich gefleckt); S: weiß, rosa überhaucht	Fe rosa	hell creme; IIa	F: hart; Laubb (Eiche, Esskastanie)
<i>R. persicina</i>	4,5-12; blutrot, rosenrot, scharlachrot	klebrig/matt/ glänz; am Rd abzieh	F: weiß; scharf; etw fruchtig	L: creme; S: weiß, evtl rosa überhaucht	Fe rosa	creme IIb-c	Laubb
<i>R. helodes</i>	7,5-13; blutrot, rosenrot	klebrig; matt glänz; nicht abzieh	F: weiß, sehr weich; scharf; geruchlos	L: creme; S: weiß oder rosa überhaucht	Fe rosa	ocker IIIa-b	Sphagnum bei Nadelb; seltene Art
<i>R. exalbicans/depallens</i>	4-12; rosa, rosen- bis weinrot	klebrig; glatt; glänzend; 1/2 abzieh	F: weiß; scharf; etw fruchtig	L: ocker; S: weiß, oft rosa überhaucht	Fe rosa	ocker IIIa-c	ges Frk grauweiß ausblassend; Birken
<i>R. pseudointegra</i>	3-12; sattrosa bis leuchtend kirschrot- zinnoberrot	trocken; matt; glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß; bitterl- schärfkratzend; fruchtig	L: gelblich S: weiß	Fe rosa; SV rot (Exs)	blass gelb IVb	Fl jg sehr hart; Laubb (gerne Eichen)
<i>R. intermedia/lundellii</i>	8-15; gelborange, leuchtend orange bis ziegelrot, weinrot	glatt, glänzend, klebrig; 1/3 abziehbar	F: weiß; bitterl- schärf ; geruchlos	L: satt safrangelb; S: weiß	Fe rosa	lebhaft gelb IVd-e	Laubb (Birken)

Hut orange bis rot, M, mild 	i d	Hutgröße in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen S: Stiel	Farb- Reaktion	Spp-Farbe	Notizen
<i>R. vesca</i>		4-10; fleischrosa, fleischrot, braunrot	klebrig/matt glänz/glatt; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: creme, rostfleckig; S: weiß	Fe intensiv orange-rosa	weiß; Ia	sehr kleine Sp; Huthaut am Rd zurückgezogen
<i>R. zvarae</i>		3-8; rosa bis rot, purpurrot, karminrot	trocken/matt (bereift)/glatt	F: weiß; mild; schwach fruchtig	L: hellcreme; S: weiß, rosa überhasucht	Fe rosa	weiß bis weißlich; 1a-b	Laubb (Eiche, Esskastanie, Rotbuche)
<i>R. aquosa</i>		3,5-7; karmin- bis lilarot	klebrig/ glänz/glatt; fast vollst abzieh	F: weiß, weich; mild; etw fruchtig	L: weißlich S: weiß	Fe rosa	weißlich; Ib	H-Mitte immer dunkler ; Laub- u Nadelb; saure Böden
<i>R. aurora /velutipes</i>		3-10; hell himbeer- bis rosenrot	klebrig/ glänz/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: weißlich; S: weiß	Fe rosa; SV am Exs lebhaft rot	weißlich; Ib	Stiel oben netzartig- flockig ; Laub- u Nadelb
<i>R. purpurata</i>		4-7,5; blutrot, purpurrot, Mitte dunkler	trocken/ glänz/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; Heringslake	L: hell ocker; S: weiß oder rosa	Fe grün	creme- hell ocker; IIId-IIIb	Fl neigt zum Bräunen ; Eiche, Rotbuche

R. vinosa		5-10; wein- bis purpurrot, Mitte dunkler	klebrig/ glänz/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß, grauend ; mild; geruchlos	L: hell ocker; S: weiß; S+L: grauend	Fe rosa od grünlich; Formol rosa	hell ocker; IIIa-b	Fichte, Tanne, Kiefer; feuchte, saure Böden
R. velenovskyi		4-9; tiefrot, ziegelrot, rostfarben, sienna, orangerot, warmrot	klebrig/ glänz/glatt; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: hellgelb; S: weiß, manchmal rosa überhaucht	Fe rosa	ocker; IIIa-b	Laub- und Nadelb (Birke, Fichte)
R. nitida		3-10; hellrot, purpurrot, weinrot	klebrig/glänz/ Rd gerieft ; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: ocker; S: weiß, basal oft rosa	Fe rosa	ocker; IIIb-c	Birke, Fichte; feuchte Böden
R. aurea /aurata		5-10; orange- bis zinnoberrot	klebrig/glänz/ glatt; 1/3 abzieh	F: weiß, unter der Hh gelb ; mild; geruchlos	L: ocker, Schn goldgelb; S: weiß, oft z.T. gelb	Fe rosa	ocker bis blass gelb; IIIb-IVb	Laubb u Nadelb
[<i>R. sericatula</i>]		5-10; ziegel- bis weinrot	trocken/matt glänz/ glatt; ½ abzieh	F: weiß; mild; säuerlich-fruchtig	L: gelblich; S: weiß	Fe rosa	hell gelb; IVa-b	Laubb (Eichen, Hain- und Rotbuche)
R. laeta/borealis		3-9; dunkelrot, orangerot, braunrot, Mitte orangegebl	trocken/matt/ glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: lebhaft gelb; S: weiß	Fe rosa	goldgelb; IVc	Laubb; gerne Kalkböden
Hut orange bis rot, M, scharf bis bitter 	i d	Hutgröße in cm Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen S: Stiel	Farb-Reaktion	Spp-Farbe	Notizen
R. hydrophila/ griseascens		3,5-7; rosa bis karminrot	klebrig/ glänzend/glatt 2/3 abzieh	F: weiß, weich; sehr scharf; schwach fruchtig	L weiß, S grauend	Fe rosa	weiß; la	Birke, Fichte; saure Moore, gern im Sphagnum
R. nobilis/mairei		2,5-9,5; gleichm karmin-kirschrot	klebrig/ matt glänz/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; schwach fruchtig	L: creme; S: weiß	Fe rosa	weiß; la	Rotbuche
R. emetica		3-10; gleichm zinnober- bis kirschrot	klebrig/ glänzend/glatt; fast ganz abzieh	F: weiß; brennend scharf; fruchtig	L+S: weiß	Fe rosa	weiß; la	Fichte, Kiefer; moorige, saure Böden
R. atropurpurea		4-10; purpur- bis weinrot	klebrig/ glänzend/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mehr o weniger scharf; schwach fruchtig	L: weißlich; S: weiß	Fe rosa	weiß; la	Laub- und Nadelb (Eichen)

<u>R. atrorubens</u>	3-7; karmin- bis weinrot, Mitte dunkler	klebrig/ glänzend/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; fruchtig	L+S: weiß	Fe rosa	weiß- weißlich; Ia-b	Nadelb; feuchte, saure Böden
<u>R. laccata</u>	3-7; lilarosa, rosa, weinrot, ziegelrot, schwarzrot, Mitte meist dunkler	klebrig/ glänzend/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; fruchtig	L+S: weiß	Fe rosa	weiß- weißlich; Ia-b	Weidearten (<i>Salix</i> sp.)
<u>R. luteotacta</u>	3-7; rosa, blut- bis korallenrot	klebrig/glänz/ glatt; nicht abzieh	F: weiß; sehr scharf; schwach fruchtig	L+S: weiß, bei Liegenlassen stark gelb fleckend	Fe rosa	weiß- weißlich; Ia-b	L oft mitunter sehr entfernt; Laubb; Kalkböden
<u>R. aquosa</u>	3,5-7; karmin- bis lilarosa	klebrig/ glänz/glatt; fast vollst abzieh	F: weiß, weich; mild; etw fruchtig	L: weißlich; S: weiß	Fe rosa	weißlich; Ib	H-Mitte immer dunkler; Laub- u Nadelb; saure Böden
<u>[R. queletii + fuscrobroides]</u>	3-9; weinrot	klebrig/glänz/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; Stachelbeerkomp ott	L: hellcreme; S: rosa, weinrot, purpurn	Fe rosa; NH3 negativ	intensiv creme; IId	Nadelb; Kalkböden
<u>R. fragilis</u>	3-7; rötlich mit schwarzer Mitte	klebrig/glänz/ glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; schwach fruchtig	L+S: weiß	Fe rosa; NH3 negativ	weißlich; Ib	Laub- und Nadelb (Eichen)
<u>R. sardonica</u>	4-10; dunkel violettrot purpurrot	klebrig/glänz/ glatt; nur am Rd abzieh	F: gelblich; sehr scharf, fruchtig	L: schon jung zitrin; S: violett, purpurn	Fe rosa; NH3 rosa	creme- ocker; IId-IIIa	Kiefern; trockene, saure Böden
<u>R. torulosa</u>	4-10; weinrot, violettrot	klebrig/glänzendglatt; am Rd abzieh	F: weiß; scharf; fruchtig	L: creme; S: weinrot, purpurviolett	Fe rosa; NH3 negativ	hell ocker; IIIa	Kiefern; trockene, saure Böden
R. rhodopus/rhodopoda	4-10; blut- bis kirschrot	klebrig, glänzend; glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mehr o weniger scharf; fruchtig	L: hell ocker; S: weiß, rot geflammt	Fe rosa	hell ocker; IIIa-b	Hut auch trocken stark glänzend; Nadelb; saure Böden
<u>R. sanguinaria /sanguinea</u>	3-10; blut- bis purpurrot, zu creme verblässend	klebrig/matt glänz/ glatt; n abzieh	F: weiß; scharf; geruchlos	L: hell ocker; S: weiß oder rot geflammt, gerne gilbend	Fe rosa	hell ocker; IIIa	L bogig, F dick; Nadelb (Kiefer)
R. rubra	4-10; zinnober bis rosenrot, Mitte dunkler	trocken/matt/ glatt; nicht abzieh	F: weiß, bei Liegenlass grauend; scharf; nach Honig	L: gelblich; S: weiß, grauend	Fe rosa	ocker; IIIb	Rotbuchen; kalkhold

R. badia		6-10; weinrot, braunrot	klebrig/ glänzend/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; geruchlos; verzögert sehr scharf	L: gelblich od ocker; S: weiß	Fe rosa	intensiv ocker- hellgelb; IIIc-IVa	Nadelb; saure Böden; Riecht man intensiv im Lamellenbereich, nimmt man einen „scharfen“ Geruch wahr
<i>R. maculata</i>		3-10; orange, orange- bis purpurrot	klebrig/ glänzend/glatt; wenig abzieh	F: weiß; scharf; fruchtig	L: buttergelb; S: weiß	Fe rosa	gelb; IVc	H meist punktförmig gefleckt; Laubb Rotbuche, Eiche
<i>R. rutila</i>		2,5-8; hellrot bis bräunlich rot	trocken/matt/ glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; scharf; geruchlos	L: intensiv gelb; S: weiß	Fe rosa	gelb; IVc	Laubb (Rotbuche, Hainbuche, Eiche; kalkhold
<i>R. cuprea</i>		3-8; wein- bis purpurrot	klebrig/matt/ glatt; wenig abz	F: weiß; verzögert scharf; geruchlos	L: goldgelb; S: weiß	Fe rosa	dottergelb IVd-e	Laubb
R. decipiens		4-10; dunkel-, wein-, ziegel-, korallen- bis purpurrot, rosa, bräunlichrot	klebrig/ glänzend/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; scharf; schwach fruchtig	L: ockergelb; S: weiß	Fe rosa	IVe	Laubb (Eiche, Hainbuche, Esskastanie)

Hut orange bis rot, S, mild 	i d	Hutgröße in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	reife Lamellen (L); Stiel (S)	Farb- Reaktion	Spp-Farbe	Notizen
<i>R. emeticolor</i>		2,5-5,5; blutrot, hellrot, korallenrosa	etw klebrig/Rand gerieft/seidig glänz; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: weiß; S: weiß	Fe rosa; SV: negativ	weiß; Ia	H-Mitte bedudert; Rotbuche; wärmebegünstigt
R. amoena		2-5; weinrot, dunkel karminrot	trocken/ matt/glatt; kaum abzieh	F: weiß; mild; Stearin, Krustentiere	L: creme, Schn manchmal rot; S: karminrot überhaucht	Fe rosa; Ph rotviolett	hell creme; IIb	Laubb (Esskastanie, Eiche, Rotbuche); saure Böden
R. puellaris		3-6; wein- bis violettrotl, dunkel rötl, lachspurpurn	klebrig/glänzend/Rd gerieft; ½ abzieh	F: weiß, stark gilbend; mild; geruchlos	L: ocker; S: weiß, stark gilbend	Fe rosa	intensiv creme; IIc-d	Frk fragil, stark gilbend; Nadelb; saure Böden
<i>R. robertii/ sphagnophila</i>		3-6; fleischrosa, blass weinrot	klebrig/glänzend/Rd gerieft; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: ocker; S: weiß	Fe rosa	intensiv creme; IIc-d	Frk fragil; feucht, Moor; Sphagnum bei Betula
R. melzeri		2-6; rosen-, blut- bis zinnoberrrot, karminrot	trocken/ matt/ körnig aufgerissen; 2/3 abzieh	F: weiß; mild; fruchtig	L: hellocker: S: weiß	Fe rosa;	hell ocker; IIla-b	Laubb (Esskastanie, Eiche, Rotbuche); wärmebegünstigt

<u>R. purpurata</u>	3-6,5; blut- bis purpurrot	trocken/matt glänz/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß, etw bräunend; mild; heringsartig	L: hellocker; S: weiß oder rosa geflammt	Fe grün (vorher evtl kurzzeitig rosa)	hell ocker; IIIa-b	Laubb (Eiche, Rotbuche)
<u>R. versicolor</u>	2-6; creme/oliv/rot /braun/ocker/grün	klebrig; glänzend; glatt; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: ocker; S: weiß, Basis gilbend	Fe rosa	helllocker; IIIa-b	Birken ; heller Standort
R. font-queri	4-6,5; orangerot	klebrig; glänzend; glatt	F: weiß; mild; geruchlos	L: weiß; S: weiß, selten rosa überhaucht	Fe rosa	hell gelb; IVa-b	Birke; Moorwälder
<u>R. nauseosa</u>	2-6; hell weinrot, zartrosa, lilarosa	schleimig/glänzend/höckrig gerieft; fast ganz abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: gelb; S: weiß	Fe rosa	gelb; IVb	Frk fragil; Picea; basenreiche Böden
<u>R. odorata</u>	1,5-5; karmin- bis weinrot	klebrig/ glänzend/ glatt; 2/3 abzieh	F: weiß, etw gilbend; mild; stark obstig	L: intensiv gelb; S: weiß, von Basis her gilbend	Fe rosa	gelb; IVb-c	Laubb (Eiche)
<u>R. cessans</u>	2,5-6; karmin-, purpur-, violettrot	klebrig; seidig glänzend; glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: gelb; F: weiß	Fe rosa	gelb; IVb-c	Kiefer; saure Böden
<u>R. risigallina</u> <u>/chamaeleontina</u>	1,5-6,5; karmin-, orangerot, aprikotfarben	klebrig/ glänzend/ glatt; fast ganz abzieh	F: weiß; mild; frische Frk geruchlos, überreife obstig	L: dottergelb; F:weiß	Fe rosa	intensiv gelb; IVd	Laub- u Nadelb

Hut orange bis rot, S, scharf bis bitter 	i d	Hutgröße in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	reife Lamellen (L); Stiel (S)	Farb-Reaktion	Spp-Farbe	Notizen
<u>R. betularum</u>		1,5-5,5; hellrot o rosenrot, rosa	klebrig/glänzend/ glatt; fast ganz abzieh	F: weiß; brennend scharf; geruchlos	L: hell creme; S: weiß	Fe rosa	weiß; la	Birke; feuchte, saure Böden
<u>R. silvestris</u>		3-6; rosa, karmin- bis kirschrot;	klebrig/glänzend /glatt; fast ganz abzieh	F: weiß; sehr scharf; fruchtig	L: weiß; S: weiß	Fe rosa	weiß; la	Laub- u Nadelb; trockene, saure Böden
R. gracillima		3-6; wein- bis violettrot, karmin- bis lachsrosa, rosa	klebrig/glänzend /Rd gerieft; 1/2 abzieh	F: weiß; mäßig scharf; geruchlos	L: blass creme; S: weiß, karminrosa überhaucht	Fe rosa	hell creme; IIa-b	

<u>R. versicolor</u>		2-6; weinrot	klebrig/seidig glänzend/glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß, oft gilbend; scharf, besonders Lamellen; geruchlos	L: hellocker; S: weiß, gilbend	Fe rosa	hell ocker; IIIa-b	Birke; heller Standort
Hut grün, XL, mild 								
	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Spp- farbe	Notizen
<u>R. cyanoxantha</u>		4-15 cm; grasgrün, blaugrün, olivgrün	klebrig/glänzend/ glatt; 1/3 abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: schmierig-fettig- biegsam, weiß; S: weiß, selten rosa überhaucht	Fe neg , n 30 Min graugrün	weiß la	1*; Laub- & Nadelb
<u>R. heterophylla</u>		4-12 cm; grün, oliv-, grau-gelblich-, braungrün	klebrig/mattglänz/gla tt; ¼ abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: weiß, meist rostfleckig; S: weiß, Basis oft bräunend	Fe intensiv orange-rosa	weiß la	sehr kleine Sp; Laub- & Nadelb
<u>R. virescens</u>		5-15 cm; grün, grau- bis olivgrün, weißgrün gras- bis spangrün	trocken/matt/ gefeldert; 1/2 abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: creme S: weiß	Fe rosa	weißlich la-b	Laubb
<u>R. aeruginea</u>		4-12; grün, grau- bis olivgrün, weißgrün	klebrig/ mattglänz/glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß; mild (L meist schärfli); geruchlos	L: buttermilch; S: weiß, Basis oft bräunend	Fe rosa	creme IIb	Birken , Fichten, Kiefern
<u>R. medullata</u>		4-12; immer blass: bläulichgrün, graugrün, blass oliv- bis lauchgrün	klebrig/glänzend/glatt ; 1/2 abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: hell buttermilch; S: weiß	Fe rosa	IIIa-c	Laubb; Parkanlagen
<u>R. olivacea</u>		9-16; grün	trocken/matt/ glatt; nicht abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: gelblich; Schn oft rot; S: weiß, meist apikal rosa	e rosa; Ph rotviolett	gelb; IVb-d	Sp isoliert-stachelig, Hh oft konz gerunzelt, Laubb
<u>[R. romellii]</u>		6-13; grün, olivgrün, ockergrün	trocken/glänzend/gla tt; 1/2 abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: buttermilch; S: weiß	Fe rosa; Ph braun	lebhaft gelb; IVd	Laubb
Hut grün, XL, scharf bis bitter 								
	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Spp- farbe	Notizen
keine								

Hut grün, M, mild 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Spp- farbe	Notizen
R. parazurea		4-7; bläulich grün	trocken/schorfig bereift/ matt; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: creme S: weiß	Fe rosa	creme; IIb-c	F unter der HH grau; Sp teilnetzig; Laubb- + Nadelb (Eichen)
<i>R. anatina</i>		3-10; olivgrün, graugrün	klebrig/matt/ Randbereich kleinfeldrig; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: creme S: weiß	Fe negativ	intensiv creme; IIc-d	H-Rd-Bereich kleinfeldrig aufgerissen; Laubb (Eiche, Hain- und Rotbuche)
R. cicatricata		3-9; olivgrün	trocken; mattglänz; glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; Heringslake	L: blässer; S: weiß	Fe grün	hell ocker IIIa	Frk neigt zum Bräunen; Laubb (Eichen)
<i>R. carpini</i>		5-10; grünlich	schleimig; glänzend; glatt; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: dottergelb; S: weiß	Fe rosa	lebhaft gelb IVd	Hainbuchen
Hut grün, M, scharf bis bitter 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Spp- farbe	Notizen
[R. laccata]		3-7; oliv, grün	klebrig/ glänzend/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; fruchtig	L+S: weiß	Fe rosa	weiß- weißlich; Ia-b	Weidearten (Salix sp.)
[R. fragilis]		3-7; grünlich	klebrig/glänz/ glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; schwach fruchtig	L+S: weiß	Fe rosa; NH3 negativ	weißlich; Ib	Laubb- und Nadelb (Eichen)
[R. sardonias]		4-10; olivlich, grünlich	klebrig/glänz/ glatt; nur am Rd abzieh	F: gelblich; sehr scharf, fruchtig	L: schon jung zitrin; S: violett, purpurn	Fe rosa; NH3 rosa	creme- ocker; IId- IIIa	Kiefern; trockene, saure Böden
<i>R. urens</i>		7-11; grün, olivgrün	trocken; glänzend; glatt; ½ abzieh	F: weiß; geruchlos; scharf	L: dottergelb; S: weiß	Fe rosa	lebhaft gelb IVd-e	Laubb; wird auch als Farbform von <i>R. cuprea</i> oder <i>R. adulterina</i> angesehen
Hut grün, S, mild 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Spp- farbe	Notizen
R. versicolor		2-6; gelbgrün, olivgrün, grünlich	klebrig; glänzend; glatt; ½ abzieh	F: weiß; mild	L: ocker; S: weiß, Basis gilbend	Fe rosa	heller ocker IIIa-b	Birken; heller Standort

<i>R. olivascens/postiana</i>		3-5; gelbgrün, olivgrün, braunoliv	schleimig/glänzend/ Rd gerieft; fast ganz abzieh	F: weiß; geruchlos; mild	L: orangegelb; S: weiß	Fe rosa	lebhaft gelb; IVd-e	Nadelb (Fichten)
Hut grün, S, scharf bis bitter 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Spp- farbe	Notizen
<i>[R. pelargonica + R. violacea]</i>		2-5; grünlich, grünl gelb	klebrig; glänzend; glatt; ½ abzieh	F: weiß; scharf; nach Geranien o Obst	L: creme; S: weiß	Fe rosa	blass creme; IIa-b	fragile Arten; Laubb (Pappeln, Erlen, Eichen, Linden, Ulmen, Hainbuchen)
<i>R. versicolor</i>		2-6; gelbgrün, olivgrün, grünlich	klebrig; glänzend; glatt; ½ abzieh	F: weiß; mild, jung: L oft scharf, geruchlos	L: ocker; S: weiß, Basis gilbend	Fe rosa	hellocker IIIa-b	Birken ; heller Standort
Hut weiß bis gelb, ocker, XL, mild   	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporen- pulver- farbe	Notizen
<i>[R. lepida /rosacea]</i>		5-12; weiß bis creme	trocken; matt; glatt; nicht abzieh	F: weiß; sehr hart; mild-bitterlich; Zedernholzgeruch	L: creme, Schn oft rötlich, S: weiß bis komplett rosa o rot	Fe rosa	blass creme; IIa	F sehr hart; Laubb
<i>[R. decolorans]</i>		4-12; oranglich gelb	trocken; glänzend; glatt; am Rd abzieh	F: weiß, grauend; mild; geruchlos	L: creme, grauend; S: weiß, grauend	Fe rosa; Formol rosa	intensiv creme; IIc-d	Nadelb; gern Moorwälder
<i>[R. faginea]</i>		6-14; schmutzig creme	trocken; matt; glatt; nicht abzieh	F: weiß; mild; Heringslake	L: ocker; S: weiß	Fe grün	ocker- blass gelb; IIIb-IVa	Frk neigt zum Bräunen; Rotbuchen
<i>[R. curtipes]</i>		6-12; creme	trocken; matt; glatt; nicht abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: ocker S: weiß	Fe rosa; Ph braun	ocker- blass gelb; IIIc-IVb	S meist kürzer als H-Breite; Laubb
<i>[R. pseudointegra]</i>		3-12; weißlich, creme	trocken; matt; glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß; mild; fruchtig	L: gelblich; S: weiß	Fe rosa; SV am Exs rot	blass gelb IVb	F jg sehr hart; Laubb (gerne Eichen)
<i>[R. integra]</i>		5-15; ocker	klebrig; matt; glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: ocker; S: weiß	Fe rosa; Ph braun	gelb; IVc	Nadelb
<i>[R. romellii]</i>		6-13; weiß, creme	trocken; glänzend; glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: buttergelb; S: weiß	Fe rosa; Ph braun	lebhaft gelb; IVd	Laubb

Hut weiß bis gelb, ocker, XL, scharf bis bitter 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporen- pulver- farbe	Notizen
R. illota		4-15; schmutzig hellocker	schleimig; höckrig gerieft; ½ abziehbar	F: weiß; scharf; dumpf bittermandelartig	L: creme, Schneiden schwarz punktiert; S: bräunlich punktiert	Fe rosa	creme; IIa-b	Frk macht schmutzigen Eindruck; Laubb; Kalkboden
R. viscida		5-14; gelb	klebrig; glatt; glänzend; nur am Rand abziehbar	F: weiß; Lam scharf, Hut-Fl mild; fruchtig	L: weißlich-hell creme; S: sehr hart, von unten her bräunend	Fe rosa; KOH S-Basis rot	creme; IIb	Laub- u Nadelb;
R. exalbicans /depallens		4-12; weißlich bis schmutzig creme	klebrig; glatt; glänzend; 1/2 abziehbar	F: weiß; scharf; etw fruchtig	L: ocker; S: weiß, oft rosa überhaucht	Fe rosa	ocker IIIa-c	ges Frk grauweiß auslassend; Birken
R. pseudointegra		3-12; weißlich, creme	trocken; matt; glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß; bitterlich- schärflich- kratzend; fruchtig	L: gelblich; S: weiß	Fe rosa; SV am Exs rot	blass gelb IVb	F jg sehr hart; Laubb (gerne Eichen)
R. foetens + R. subfoetens		6-15; bräunlichgelb, ockergelb,	schleimig; höckrig gerieft; ½ abziehbar	F: weiß; eklig; widerlich-scharf	L: creme; S: weißlich- gelblich	Fe rosa	creme; IIb-c	S alt gekammert hohl; Laub- und Nadelb
R. adulterina		7-12; bräunlich gelb	klebrig; glatt; glänzend; ½ abziehbar	F: weiß; scharf; fruchtig	L: gelb; S: weiß	Fe rosa	intensiv gelb; IVe	Nadelb; Kalkböden
Hut weiß bis gelb, ocker, M, mild 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporen- pulver- farbe	Notizen
R. aurora /velutipes		3-10; weißlich	klebrig/ glänz/glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: weißlich; S: weiß	Fe rosa; SV am Exs rot	weißlich; Ib	Stiel oben netzartig- flockig; Laub- u Nadelb
R. violeipes		5-10; zitronengelb, grünlichgelb	trocken/matt/glatt/ bereift 1/2 abziehbar	F: weiß; mild; Krabben, Stearin	L: creme; S: weiß bis violett	Fe rosa	creme; IIa-b	Hut fühlt sich seifig an; Laubb
R. ochroleuca		5-10; ocker-, zitronen- oder grünlichgelb	trocken/matt glänz/glatt; ½ abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: weiß; S: weiß, St-Basis gelblich	Fe rosa, KOH: S-Basis rot	weiß- weißlich; Ia-b	Stiel etw grauend; Laub- und Nadelb
R. faustiana		4-10; beige, creme, rosalich creme, graubeige, ocker	trocken/matt/glatt; kaum abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: blass creme; S: weiß	Fe rosa	intensiv creme; IIc-d	basische Böden; Laubb (Rotbuche , Eiche)

<i>R. galochroa</i>		4-8; elfenbeincreme, hell beige	/ glatt; 1/3 abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: creme; S: weiß	Fe rosa	intensiv creme; IIc-d	seltene Art; Laubb (Eichen); Kalkböden)
<i>R. claroflava</i>		4-10; zitronen-, gold-, kanarien, grünlichgelb	klebrig/glänzend/glatt; ½ abzieh	F: weiß, grauend; mild; geruchlos	L: creme, grauend S: weiß, frauend	Fe rosa; Formol rosa	ocker; IIIb-c	F vor dem Grauen oft rötend; Birklen; Moore, Moorränder
<i>[R. aurea /aurata]</i>		5-10; gelb	klebrig/glänz/glatt; 1/3 abzieh	F: weiß, unter der Hh gelb ; mild; geruchlos	L: ocker, Schn goldgelb; S: weiß, oft z.T. gelb	Fe rosa	ocker bis blass gelb; IIIb-IVb	Laubb u Nadelb
<i>R. cremeo-avellanea</i>		3-8; elfenbeinfarben, blass bis intensiv gelb oder ocker	klebrig/glänzend/glatt;	F: weiß; mild; geruchlos	L: hellgelb; S: weiß	Fe rosa	gelb; IVb-c	seltene Art; Birken
<i>[R. laeta /borealis]</i>		4-9; orangelig gelb, ockergelb	klebrig/glänzend/glatt; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: butter- bis goldgelb; S: weiß	Fe rosa	goldgelb; IVc	Laubb
<i>R. carpini</i>		5-10; creme, olivlich creme	schleimig/glänzend/glatt; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: dottergelb; S: weiß	Fe rosa	lebhaft gelb IVd	Hainbuchen

Hut weiß bis gelb, ocker, M, scharf bis bitter 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb-Reaktionen	Sporen-pulver-farbe	Notizen
<i>R. farinipes</i>		3-9; creme, blass ocker, ocker, bräunlich gelb	klebrig/glänzend/höckrig gerieft; nicht abzieh	F: weiß; scharf; fruchtig	L: hell creme; S: weiß	Fe rosa	weiß; Ia	L zäh elastisch ; S alt gekammert hohl; Laubb (Rotbuchen); Kalkboden
<i>R. fellea</i>		4-10; hell- bis ockergelb, Mitte honigfarben	klebrig/glänz/glatt; nicht abzieh	F: weiß; brennend scharf; fruchtig	L: ockerlich gelb; S: : ockerlich gelb	Fe äußerst schwach rosa	weiß; Ia	Rotbuchen
<i>[R. luteotacta]</i>		3-7; weiß	klebrig/glänz/glatt; 1/3 abzieh	F: weiß; sehr scharf; schwach fruchtig	L+S: weiß, bei Liegenlassen stark gelb fleckend	Fe rosa	weiß-weißlich; Ia-b	L mitunter sehr entfernt ; Laubb; Kalkböden
<i>R. grata /laurocerasi</i>		5-9; senfocker, hellocker; orangeocker	schleimig/glänzend/höckrig gerieft; am Rand abzieh	F: weiß; scharf; unge-quetschte L intensiv nach Marzipan	L: creme; S: weiß, bräunl	Fe rosa	blass creme; IIa-b	*) S alt gekammert hohl; Laubb (Rotbuchen); Kalkboden
<i>R. fragrantissima</i>		6-13; senf- bis orangeocker; ocker, hellocker; (ocker)gelb	schleimig/ glänzend / maximal kurz am Rd gerieft ; kaum abzieh	F: weiß; mäßig scharf; intensiv u anhaltend n Anis	L: creme; S: weiß, bräunl	Fe rosa	IIb; creme	äußerst seltene Art ; Laubb (<i>Fagales</i>)

<i>R. ochroleuca</i>	5-10; ocker-, zitronen- oder grünlichgelb	trocken/matt glänz/glatt; ½ abzieh	F: weiß; scharf (L); geruchlos	L: weiß; S: weiß, St-Basis gelblich	Fe rosa, KOH: S-Basis orange	weiß-weißlich; Ia-b	Stiel etw grauend; Laub- und Nadelb
<i>[R. fragilis]</i>	3-7; creme; gelb	klebrig/glänz/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; schwach fruchtig	L+S: weiß	Fe rosa; NH3 negativ	weißlich; Ib	Laub- und Nadelb (Eichen)
<i>[R. praetervisa /pectinatoides]</i>	4-8; ockergelb	klebrig/glänzend/höckrig gerieft; ½ abzieh	F: weiß; mild, unangenehm kratzend; fruchtig	L: creme; S weiß	Fe rosa	intensiv creme; IIc-d	S-Basis oft rotfleckig ; Laub- und Nadelb (Eichen)
<i>R. solaris</i>	2-7; hell zitronengelb, dottergelb, goldgelb, orangegelb	klebrig/glänzend/ Rd gerieft	F: weiß; scharf; fruchtig	L: creme; S: weiß	Fe rosa	creme bis hellocker; IIc-IIIa	Rotbuchen; Kalkböden
<i>[R. sardonja]</i>	4-10; olivlich creme, gelblich, ocker, zitronengelb	klebrig/glänz/glatt; nur am Rd abzieh	F: gelblich ; sehr scharf, fruchtig	L: schon jung zitrin ; S: violett, purpurn	Fe rosa; NH3 rosa	creme-ocker; IIc-IIIa	Kiefern; trockene, saure Böden
<i>[R. sanguinea /sanguinaria]</i>	3-10; weiß, creme	klebrig/matt glänz/glatt; n abzieh	F: weiß; scharf; geruchlos	L: hell ocker; S: weiß oder rot, gilbend	Fe rosa	hell ocker; IIIa	L bogig, F dick ; Nadelb (Kiefer)
<i>R. maculata</i>	3-10; gelb	klebrig/glänzend/glatt; wenig abzieh	F: weiß; scharf; fruchtig	L: buttergelb; S: weiß	Fe rosa	gelb; IVc	H meist punktf gefleckt ; Laubb, Rotbuche, Eiche

Hut weiß bis gelb, ocker, S, mild 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb-Reaktionen	Sporen-pulver-farbe	Notizen
<i>[R. font-queri]</i>		4-6,5; gelb	klebrig; glänzend; glatt	F: weiß; mild; geruchlos	L: weiß; S: weiß, selten rosa	Fe rosa	hell gelb; IVa-b	Birke ; Moorwälder
<i>R. olivascens /postiana</i>		3-5; olivlichgelb, grünlichgelb, gelb	schleimig/glänzend/ Rd gerieft; fast ganz abzieh	F: weiß; geruchlos; mild	L: orangegelb; S: weiß	Fe rosa	gelb; IVd-e	Nadelb (Fichten)
<i>R. acetolens /lutea/vitellina</i>		2-6; lebhaft goldgelb, buttergelb, chromgelb	klebrig/glänzend/glatt; fast ganz abzieh	weiß; mild; säuerlich-fruchtig	L: safran- bis orangegelb; S: weiß	Gr rosa	intensiv gelb; IVd	Laubb, Haselnuss-Sträucher
<i>[R. risiqallina/ chamaeleontina]</i>		1,5-6,5; gelb	klebrig/glänzend/glatt; fast ganz abzieh	weiß; mild; frische Frk geruchlos	L: dottergelb; F:weiß	Fe rosa	intensiv gelb; IVd	Geruch überreifer Frk: obstig Laub- u Nadelb

Hut weiß bis gelb, ocker, S, scharf bis bitter 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb-Reaktionen	Sporen-pulver-farbe	Notizen
---	-----	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------	---------

R. betularum	1,5-5,5; weiß bis creme	klebrig/glänzend/glatt ; fast ganz abzieh	weiß; brennend scharf; geruchlos	L: hell creme; S: weiß	Fe rosa	weiß; la	Birke; feuchte, saure Böden
<i>R. raoultii</i>	3-6; weißlich, creme, zitronengelb	klebrig/glänzend/glatt; fast ganz abzieh	weiß; scharf; fruchtig	L: creme; S: weiß	Fe rosa	weiß; la	Laubb
[R. silvestris]	3-6; weuß, creme, gelblich	klebrig/glänzend/glatt ; fast ganz abzieh	weiß; sehr scharf; fruchtig	L: weiß; S: weiß	Fe rosa	weiß; la	Laub- u Nadelb; trockene, saure Böden

Hut grau bis braun, XL, mild	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb-Reaktionen	Sporen-pulver-farbe	Notizen
R. heterophylla		4-12 cm; oliv- bis bronzebraun, ocker	klebrig/mattglänz/glat t; ¼ abzieh	F: mild; geruchlos	L: weiß, meist rostfleckig; S: weiß, Basis oft bräunend	Fe intensiv orange-rosa	weiß; la	sehr kleine Sp; Laub- & Nadelb
[R. melliolens]		4-12; bräunlich, rotbräunlich	trocken/matt/glatt; 1/2 abzieh	F: mild; beim Trocknen Honig	L: blass creme; S: weiß, selten rosa behaucht	Fe rosa	blass creme; IIa-b	Sp völlig rund; Laubb
R. mustelina		5-12; ocker-, hasel- bis rotbraun	klebrig/glänzend/glatt ; nur am Rand abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: creme; S: weiß	Fe intensiv orangerosa	blass creme; IIb	Bergwälder; Fichten; saure Böden
<i>R. medullata</i>		4-12; immer blass: grauocker, ocker, bräunlich- bis grünlichgrau, olivgrau	klebrig/glänzend/glatt ; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: hell buttergelb: S: weiß	Fe rosa	IIIa-c	Laubb; Parkanlagen
R. faginea		6-14; schmutzig braun, wein- bis rosabraun	trocken/matt/glatt; nicht abzieh	F: weiß; mild; Heringslake	L: ocker; S: weiß	Fe grün	ocker- blass gelb; IIIb-IVa	Frk neigt zum Bräunen; Rotbuchen
R. curtipes		6-12; kakaobraun, rotbraun, weinbraun, Mitte creme, ockerl	trocken/matt/glatt; nicht abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: ocker S: weiß	Fe rosa; Ph braun	ocker- blass gelb; IIIc-IVb	S meist kürzer als H-Breite; Laubb
R. vinosobrunnea		5,5-18; purpurbraun, kastanienbraun, zigarrenbraun	trocken/mattglänz/ glatt; am Rd. abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: gelblich; S: weiß oder rosa überhaucht	Fe rosa; Ph rotviolett	gelb; IVb-c	Sp isoliert warzig mit kurzen Verbindungen; Laubb (Rot- und Hainbuchen, Eichen, Esskastanien)
R. integra		5-15; rotbraun, braun, gelbbraun, purpurbraun	klebrig/matt/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: ocker; S: weiß	Fe rosa; Ph braun	gelb; IVc	Nadelb

R. alutacea		7-13; rotbraun, weinbraun, rotbraun	trocken/matt/ glatt; 1/2 abziehbar	F: mild; geruchlos	L: gelblich; S: weiß, manchmal basal rosa	Fe rosa; Ph rotviolett	gelb; IVb-d	Sp teilnetzig-gratig; Laubb (Rotbuchen)
R. olivacea		9-16; wein- bis purpurbraun, braun, olivbraun	trocken/matt/glatt; nicht abziehbar	F: mild; geruchlos	L: gelblich; Schn oft rot ; S: weiß, meist apikal rosa	Fe rosa; Ph rotviolett	gelb; IVb-d	Sp isoliert-stachelig, Hh oft konz gerunzelt , Laubb

Hut grau bis braun, XL, scharf bis bitter 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporen- pulver- farbe	Notizen
R. illota		4-15; schmutzig braun, gelb- bis ockerbraun	schleimig/höckrig gerieft; ½ abziehbar	F: weiß; scharf; dumpf bittermandelartig	L: creme, Schneiden schwarz punktiert; S: bräunlich punktiert	Fe rosa	hell creme; IIa-b	Frk macht schmutzigen Eindruck; Laubb; Kalkboden
R. viscida		5-14; rotbraun, wein- bis purpurbraun,	klebrig/glänzend/glatt ; nur am Rand abziehb	F: weiß; Lam scharf, Hut-Fl mild; fruchtig	L: weißlich-hell creme; S: sehr hart, von unten her bräunend	Fe rosa; KOH S-Basis rot	creme; IIb	Laub- u Nadelb;
R. sororia		5-12; sepia- bis ockerbraun, dunkel- bis graubraun	klebrig/matt glänz/Rd gerieft; 1/2 abziehbar	F: weiß; widerlich scharf; schwach fruchtig	L: creme; S: weiß, oft dunkel überfärbt	Fe rosa	blass creme; IIb	Laub- und Nadelb
R. foetens + R. subfoetens		6-15; gelbbraun, semmelfarben, ocker	schleimig/höckrig gerieft; ½ abziehbar	F: weiß; eklig; widerlich-scharf	L: creme; S: weißlich-gelblich	Fe rosa	creme; IIb-c	S alt gekammert hohl; Laub- und Nadelb
R. adulterina		7-12; ocker-, violett- oder purpurbraun	klebrig; glatt; glänzend; ½ abziehbar	F: weiß; scharf; fruchtig	L: gelb; S: weiß	Fe rosa	intensiv gelb; IVe	Nadelb; Kalkböden

Hut grau bis braun, M, mild 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporen- pulver- farbe	Notizen
R. azurea		3-8; violett grau, olivl grau, stahlgrau	trocken; glänzend; glatt; 1/2 abziehbar	F: mild; geruchlos	L: milchweiß; S: weiß	Fe rosa	weiß; Ia	Nadelb (Fichten); Bergwälder
R. vesca		4-10; fleischbräunl,, rosabraun, lilabraun, olivbraun, rotbraun	klebrig/matt glänz/glatt; ½ abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: creme, rostfleckig; S: weiß	Fe intensiv orange-rosa	weiß; Ia	sehr kleine Sp; Huthaut am Rd zurückgezogen
R. ionochlora		5-8; violett grau, grau	klebrig/glänz/glatt; ½ abziehbar	F: weiß; mild (L jung pikant); geruchlos	L: creme; S: weiß	Fe intensiv orangerosa	hell creme; IIa	F unter der HH violett ; Sp isol warzig; Laubb

<u>R. insignis</u> <u>/livescens</u>	4-7; graubraun, umbrabraun	klebrig/glänzend/höckrig gerieft; ½ abzieh	F: weiß; mild; obstig	L: creme S: weiß, Basis gelbl	Fe rosa; KOH an H-Rd + S-Basis rot	hell creme; IIa-b	Laubb (Eichen); Parks; basenreiche Böden
<u>R. parazurea</u>	4-7; grünl grau, bläul grau, violettl grau, graubraun	trocken/schorfig bereift/ matt; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: creme S: weiß	Fe rosa	creme; IIb-c	F unter der HH grau; Sp teilnetzig; Laub- + Nadelb (Eichen)
<u>R. grisea</u>	5-8; olivl grau, iolettgrau ,lilagrau, bläul grau, violettgrau	klebrig/glänzend/glatt ; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: creme S: weiß	Fe intensiv orangerosa	creme; IIc	F unter der HH violett; Sp-Warzen vielf reihig verbund ; Laub- und Nadelb
R. brunneoviolacea	4-6; violettl braun, braun	klebrig/glänzend/glatt ; fast ganz abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: creme; S: weiß	Fe rosa	creme; IIb-c	Laubb; saure Böden
<u>R. praetervisa</u> <u>/pectinatoides</u>	4-8; gelbcker bis graubraun, gelb- bis zimtbräunl	klebrig/glänzend/höckrig gerieft; ½ abzieh	F: weiß; mild, unangenehm kratzend; fruchtig	L: creme; S: weiß	Fe rosa	intensiv creme; IIc-d	S-Basis oft rotfleckig; KOH negativ; Laub- und Nadelb (Eichen)
R. anatina	3-10; bläulich grau, grünlich grau, grau	klebrig/matt/Randbereich kleinfeldrig; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: creme S: weiß	Fe negativ	intensiv creme; IIc-d	H-Rd-Bereich kleinfeldrig aufgerissen; Laubb (Eiche , Hain- und Rotbuche)
R. faustiana	4-10; blass graubraun	trocken/matt/glatt; kaum abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: blass creme; S: weiß	Fe rosa	intensiv creme; IIc-d	Laubb (Rotbuche , Eiche)
<u>R. cicatricata</u>	3-9; olivl braun, braun, ocker	trocken/mattglänz/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; Heringslake	L: blassocker; S: weiß	Fe grün	hell ocker; IIIa-b	Frk neigt zum Bräunen; Laubb (Eichen)
R. graveolens	4-8; weinbraun, purpurbraun, braun	klebrig/glänzend/glatt ; ½ abzieh	F: mild; Heringslake	L: blassocker; S: weiß	Fe grün	hell ocker; IIIa-b	Frk neigt zum Bräunen; Laubb (Eichen)
<u>[R. vinosa]</u>	5-10; violettbraun, rotbraun, purpurbraun	klebrig/glänz/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß, grauend ; mild/geruchlos	L: hell ocker; S: weiß; S+L: grauend	Fe rosa od grünlich; Formol rosa	hell ocker; IIIa-b	Fichte, Tanne, Kiefer; feuchte, saure Böden
<u>[R. nitida]</u>	3-10; braun, olivbraun, weinbraun	klebrig/glänz/ Rd gerieft ; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: ocker; S: weiß, basal oft rosa	Fe rosa	ocker; IIIb-c	Birke, Fichte; feuchte Böden
<u>R. caerulea</u> <u>/amara</u>	4-10; violettl braun, purpurbraun	klebrig/glänzend/glatt ; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: ocker; S: weiß	Fe rosa; SV sofort rot	blass gelb; IVa-b	H spitz gebuckelt; HH bitterlich;
R. sericatula	5-10; weinbraun, braun, rehbraun	trocken/matt glänz/glatt; ½ abzieh	F: weiß; mild; säuerlich-fruchtig	L: gelblich; S: weiß	Fe rosa	hell gelb; IVa-b	Laubb (Eichen, Hain- und Rotbuche)

[R. amethystina + R. turci]		5-10; rehbraun (oft violettlicher Rd)	klebrig/glänz/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; S-Basis oft nach Jod	L: hell gelb; S: weiß	Fe rosa	ocker bis gelb; IIIb-IVc	Nadelb
<i>R. carpini</i>		5-10; rötlichbraun, lederbraun	schleimig/glänzend/glatt; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: dottergelb; S: weiß	Fe rosa	lebhaft gelb IVd	Hainbuchen
Hut grau bis braun, M, scharf bis bitter 								
	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb-Reaktionen	Sporenpulverfarbe	Notizen
[R. farinipes]		3-9; creme, hellbräunl	klebrig/glänzend/höckrig gerieft; nicht abzieh	F: weiß; scharf; fruchtig	L: hell creme; S: weiß	Fe rosa	weiß; Ia	L zäh elastisch ; S alt gekammert hohl; Laubb (Rotbuchen); Kalkboden
[R. laccata]		3-7; ocker, grau, braun, Mitte meist dunkler	klebrig/glänzend/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; fruchtig	L+S: weiß	Fe rosa	weiß-weißlich; Ia-b	Weidearten (<i>Salix</i> sp.)
[R. fragilis]		3-7; grau	klebrig/glänz/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; schwach fruchtig	L+S: weiß	Fe rosa; NH3 negativ	weißlich; Ib	Laub- und Nadelb (Eichen)
<i>R. amoenolens</i>		4-7; bräunl grau, grau- bis olivbraun	klebrig/glänzend/höckrig gerieft; 1/2 abzieh	F: weiß mit Graustich; scharf; spermatisch	L: creme, grauend S: weißl, grauend	Fe rosa	hell creme; IIa-b	Laubb (Eichen), Parks
[R. consobrina]		5-10; sepia, rußgrau, graubraun, bräunl grau, dkl braun	klebrig/glänzend/glatt; ½ abzieh	F: weiß; sehr scharf; geruchlos	L: creme; S: weiß	Fe rosa	hell creme; IIa-b	Fichten; Bergwälder; saure Böden
[R. grata /laurocerasi]		5-9; ockerbraun	schleimig/glänzend/höckrig gerieft; am Rand abzieh	F: weiß; scharf; unge-quetschte L intensiv nach Marzipan	L: creme; S: weiß	Fe rosa	blass creme; IIa-b	*) S alt gekammert hohl; Laubb (Rotbuchen); Kalkboden
[R. fragrantissima]		6-13; ockerbraun	schleimig/ glänzend / maximal kurz am Rd gerieft ; kaum abzieh	F: weiß; mäßig scharf; intensiv u anhaltend n Anis	L: creme; S: weiß, bräunl	Fe rosa	IIb; creme	äußerst seltene Art ; Laubb (<i>Fagales</i>)
[R. queletii + fuscorubroides]		3-9; weinbraun	klebrig/glänz/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; Stachelbeer-Kompott	L: hellcreme; S: rosa, weinrot, purpurn	Fe rosa; NH3 negativ	intensiv creme; IIId	Nadelb; Kalkböden
[R. sardonja]		4-10; grünlich grau, gelblich grau	klebrig/glänz/glatt; nur am Rd abzieh	F: gelblich ; sehr scharf, fruchtig	L: schon jung zitrin ; S: violett, purpurn	Fe rosa; NH3 rosa	creme-ocker; IIId-IIIa	Kiefern; trockene, saure Böden


R. badia		6-10; braun, rotbraun	klebrig/glänzend/glatt ; 1/2 abzieh	F: weiß; geruchlos; verzögert sehr scharf	L: gelblich od ocker; S: weiß	Fe rosa	intensiv ocker- hellgelb; IIIC-IVa	Nadelb; „scharfer“ Geruch saure Böden
R. cuprea		3-8; schoko-, leder-, purpurbraun	klebrig/matt/ glatt; wenig abz	F: weiß; verzögert scharf; geruchlos	L: goldgelb; S: weiß	Fe rosa	dottergelb ; IVd-e	Laubb
R. firmula		4-8; weinbraun, violettl braun, violettl grau	klebrig/glänzend/glatt ; am Rd abzieh	F: weiß; scharf; intensiv fruchtig	L: gelb; S: weiß	Fe rosa	intensiv gelb; IVd	Nadelb; Bergwälder
Hut grau bis braun, S, mild 								
	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporen- pulver- farbe	Notizen
R. puellaris		3-6; wein- bis purpurbraun	klebrig/glänzend/Rd gerieft; ½ abzieh	F: weiß, stark gilbend; mild; geruchlos	L: ocker; S: weiß, stark gilbend	Fe rosa	intensiv creme; IIc-d	Frk fragil, stark gilbend; Nadelb; saure Böden
R. robertii/ sphagnophila		3-6; olivl braun, blass kupferbraun, gelb- bis lederbraun, bräunl	klebrig/glänzend/Rd gerieft; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: ocker; S: weiß	Fe rosa	intensiv creme; IIc-d	Frk fragil; feucht, Moor; Sphagnum bei Betula
R. nauseosa		2-6; rot- bis hellbraun, purpur- bis kastanienbraun,	schleimig/glänzend/ höckrig gerieft; fast ganz abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: gelb; S: weiß	Fe rosa	gelb; IVb	Frk fragil; Picea; basenreiche Böden
Hut grau bis braun, S, scharf bis bitter 								
	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporen- pulver- farbe	Notizen
keine								
Hut blau bis violett, XL, mild 								
R. cyanoxantha		4-15 cm; violett	klebrig; glänzend; glatt; 1/3 abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: schmierig-fettig- biegsam, weiß; S: weiß, selten rosa überhaucht	Fe neg, n 30 Min graugrün	weiß; Ia	1*; Laub- & Nadelb
R. grisea		5-14; graulila, violett, purpurviolett, lila	klebrig/glänzend/glatt ; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: creme S: weiß	Fe intensiv orangerosa	creme; IIc	F unter der HH violett; Sp-Warzen vielf reihig verbund ; Laub- und Nadelb


<i>R. medullata</i>		4-12; stahlblau, hell graulichblau, violettlich	klebrig/glänzend/glatt ; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: hell buttergelb; S: weiß	Fe rosa	IIIa-c	Laubb; Parkanlagen
<i>R. romellii</i>		6-13; violett, rotviolett	trocken; glänzend; glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: buttergelb; S: weiß	Fe rosa; Ph braun	lebhaft gelb; IVd	Laubb
Hut blau bis violett, XL, scharf bis bitter 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen S: Stiel	Farb-Reaktionen	Sporen-pulver-farbe	Notizen
<i>R. viscida</i>		5-14; purpur- bis schwarzviolett	klebrig/glänzend/glatt ; nur am Rand abzieh	F: weiß; Lam scharf, Hut-Fl mild; fruchtig	L: weißlich-hell creme; S: sehr hart, von unten her bräunend	Fe rosa; KOH S-Basis rot	creme; IIb	Laub- u Nadelb;
Hut blau bis violett, M, mild 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen S: Stiel	Farb-Reaktionen	Sporenpul-ver-farbe	Notizen
<i>R. azurea</i>		3-8; bläul, königsblau, violettblaz, violett, grauviolett	trocken; glänzend; glatt; 1/2 abzieh	F: mild; geruchlos	L: milchweiß; S: weiß	Fe rosa	weiß; Ia	Nadelb (Fichten); Bergwälder
<i>R. ionochlora</i>		5-8; violett, grauviolett, lila	klebrig/glänz/glatt; ½ abzieh	F: weiß; mild (L jung pikant); geruchlos	L: creme; S: weiß	Fe intensiv orangerosa	hell creme; IIa	F unter der HH violett; Sp isol warzig; Laubb
<i>R. violeipes</i>		5-10; purpurviolett, dkl lila, gelbviolett	trocken/matt/glatt/, bereift 1/2 abzieh	F: weiß; mild; Krabben, Stearin	L: creme; S: weiß bis violett	Fe rosa	creme; IIa-b	Hut fühlt sich seifig an; Laubb
<i>R. parazurea</i>		4-7; grünl blau, schieferblau	trocken/schorfig bereift/ matt; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: creme S: weiß	Fe rosa	creme; IIb-c	F unter der HH grau; Sp teilnetzig; Laub- + Nadelb (Eichen)
<i>R. brunneoviolacea</i>		4-6; braunviolett, blauviolett, dunkel violett	klebrig/glänzend/glatt ; fast ganz abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: creme; S: weiß	Fe rosa	creme; IIb-c	Laubb; saure Böden
<i>R. anatina</i>		3-10; graubläulich	klebrig/matt/ Randbereich feldrig; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: creme S: weiß	Fe negativ	intensiv creme; IIc-d	H-Rd-Bereich kleinfeldrig aufgerissen; Laubb (Eiche , Hain- und Rotbuche)
[<i>R. nitida</i>]		3-10; weinviolett, braunviolett	klebrig/glänz/Rd gerieft; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: ocker; S: weiß, basal oft rosa	Fe rosa	ocker; IIIb-c	Birke, Fichte; feuchte Böden

<i>R. amethystina</i> + <i>R. turci</i>		5-10; amethystfarben, violett, braunviolett	klebrig/glänz/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; S- Basis oft nach Jod	L: hell gelb; S: weiß	Fe rosa	ocker bis gelb; IIIb-IVc	Nadelb
<i>R. caerulea</i> <i>/amara</i>		4-10; bräunl violett, weinpurpurn, dunkel violett	klebrig/glänzend/glatt ; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: gelbl; S: weiß	Fe rosa; SV sofort rot	blass gelb; IVa-b	H spitz gebuckelt; HH bitterlich;
<i>R. carpini</i>		5-10; violettlich	schleimig/glänzend/gl att; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: dottergelb; S: weiß	Fe rosa	lebhaft gelb; IVd	Hainbuchen
Hut blau bis violett, M, scharf bis bitter 								
	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporenpul ver- farbe	Notizen
<i>[R. atrorubens]</i>		3-7; rotviolett, Mitte dunkler	klebrig/ glänzend/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; fruchtig	L+S: weiß	Fe rosa	weiß- weißlich; Ia-b	Nadelb; feuchte, saure Böden
<i>R. laccata</i>		3-7; rotviolett, violett, schwarzviolett, Mitte meist dunkler	klebrig/ glänzend/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; fruchtig	L+S: weiß	Fe rosa	weiß- weißlich; Ia-b	Weidearten (<i>Salix</i> sp.)
<i>R. fragilis</i>		3-7; violett, rotviolett, grauviolett	klebrig/glänz/ glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; schwach fruchtig	L+S: weiß	Fe rosa; NH3 negativ	weißlich; Ib	Laub- und Nadelb (Eichen)
<i>R. cavipes</i>		3-8; lila, grünl lila, violett, grünl violett, grauviolett	klebrig/glänz/ Rd gerieft; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; intensiv fruchtig	L: hellcreme; S: weiß, gekammert hohl	Fe rosa; NH3 rosa	hell creme; IIa-b	Weißtannen; Kalkböden
<i>R. queletii + fuscobroides</i>		3-9; braunviolett, rötl violett, violett	klebrig/glänz/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; Stachelbeer- Kompott	L: hellcreme; S: rosa, weinrot, purpurn	Fe rosa; NH3 negativ	intensiv creme; IId	Nadelb; Kalkböden
<i>R. sardonia</i>		4-10; violett, dkl violett, braunviolett, rot- bis purputviolett	klebrig/glänz/ glatt; nur am Rd abzieh	F: gelblich; sehr scharf, fruchtig	L: schon jung zitrin; S: violett, purpurn	Fe rosa; NH3 rosa	creme- ocker; IId-IIIa	Kiefern; trockene, saure Böden
<i>R. torulosa</i>		4-10; violett, purpur- violett, dkl purpurn	klebrig/glänzend/glatt ; am Rd abzieh	F: weiß; scharf; fruchtig	L: creme; S: weinrot, purpurviolett	Fe rosa; NH3 negativ	hell ocker; IIIa	nicht brennend scharf wie <i>R. sardonia</i> ; Kiefern; trockene, saure Böden
<i>R. firmula</i>		4-8; braunviolett, grauviolett	klebrig/glänzend/glatt ; am Rd abzieh	F: weiß; scharf; intensiv fruchtig	L: gelb; S: weiß	Fe rosa	intensiv gelb; IVd	Nadelb; Bergwälder


Hut blau bis violett, S, mild 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporen- pulver- farbe	Notizen
[R. amoena]		2-5; lila, karminpurpur	trocken/matt/glatt; kaum abzieh	F: weiß; mild; Stearin, Krustentiere	L: creme, Schn manchmal rot; S: karminrot überhaucht	Fe rosa; Ph rotviolett	hell creme; IIb	Laubb (Esskastanie, Eiche, Rotbuche); saure Böden
R. versicolor		2-6; violettlich	klebrig; glänzend; glatt; ½ abzieh	F: weiß; mild, geruchlos	L: ocker; S: weiß, Basis gilbend	Fe rosa	hell ocker; IIIa-b	Birken ; heller Standort
R. nauseosa		2-6; lila, rosalila	schleimig/glänzend/ höckrig gerieft; fast ganz abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: gelb; S: weiß	Fe rosa	gelb; IVb	Frk fragil; Picea; basenreiche Böden
R. cessans		2,5-6; weinviolett	klebrig; seidig glänzend; glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: gelb; F: weiß	Fe rosa	gelb; IVb-c	Kiefer; saure Böden
[R. odorata]		1,5-5; weinklila	klebrig/glänzend/ glatt; 2/3 abzieh	F: weiß, etw gilbend; mild; stark obstig	L: intensiv gelb; S: weiß, von Basis her gilbend	Fe rosa	gelb; IVb-c	Laubb (Eiche)
Hut blau bis violett, S, scharf bis bitter 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporen- pulver- farbe	Notizen
R. pumila /R. alnetorum		2-5; lila, dkl violett, Mitte oft schwarz, violett(lich)	klebrig/seidig glänz/Rd gerieft; ½ abzieh	F: weiß, leicht scharf, geruchlos	L: creme, fragil; S: weißlich, gilbend	Fe rosa	weißlich; Ib	Frk fragil , Erlen, oft moorige Bereiche
R. pelargonica + R. violacea		2-5; lila, violett, rötl violett, graulich violett	klebrig; glänzend; glatt; ½ abzieh	F: weiß; scharf; nach Geranien o Obst	L: creme; S: weiß	Fe rosa	blass creme; IIa-b	fragile Arten; Laubb (Pappeln, Erlen, Eichen, Linden, Ulmen, Hainbuchen)
R. versicolor		2-6; violettlich	klebrig; glänzend; glatt; ½ abzieh	F: scharf, insbesondere Lamellen, geruchlos	L: ocker; S: weiß, Basis gilbend	Fe rosa	hell ocker; IIIa-b	Birken ; heller Standort
Hut mehrfarbig, XL, mild 	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporen- pulver- farbe	Notizen
R. cyanoxantha		4-15 cm; violett/ grün/bräunl/creme	klebrig; glänzend; glatt; 1/3 abziehbar	F: mild; geruchlos	L: schmierig-fettig- biegsam, weiß; S: weiß, selten rosa überhaucht	Fe neg , n 30 Min graugrün	weiß Ia	1*; Laub- & Nadelb

R. melliolens 	4-12; gefleckt gelb/orange/rot	trocken; matt; glatt; 1/2 abziehbar	F: mild; beim Trocknen Honig	L: blass creme; S: weiß, selten rosa behaucht	Fe rosa	blass creme; IIa-b	Sp völlig rund; Laubb
R. faginea 	6-14; rot/bräunl/gelbl/ creme	trocken; matt; glatt; nicht abziehbar	F: weiß; mild; Heringslake	L: ocker; S: weiß	Fe grün	ocker- blass gelb; IIIb-IVa	Frk neigt zum Bräunen; Rotbuchen
[R. pseudointegra]	3-12; rot/gelb/creme/weiß	trocken; matt; glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß; mild; fruchtig	L: gelblich; S: weiß	Fe rosa; SV am Exs rot	blass gelb IVb	F jg sehr hart; Laubb (gerne Eichen)
R. olivacea 	9-16; rot/creme/oliv/ braun/grau	trocken; matt; glatt; nicht abziehbar	F: mild; geruchlos	L: gelblich; Schn oft rot; S: weiß, meist apikal rosa	Fe rosa; Ph rotviolett	gelb; IVb-d	Sp isoliert-stachelig, Hh oft konz gerunzelt, Laubb
[R. romellii] 	6-13; rot/gelb, violett/gelb	trocken; glänzend; glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: buttergelb; S: weiß	Fe rosa; Ph braun	lebhaft gelb; IVd	Laubb

Hut mehrfarbig, XL, scharf bis bitter	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporen- pulver- farbe	Notizen
[R. viscida] 		5-14; braun/gelb	klebrig; glatt; glänzend; nur am Rand abziehbar	F: weiß; Lam scharf, Hut-Fl mild; frucht	L: weißlich-hell creme; S: sehr hart, von unten her bräunend	Fe rosa; KOH S-Basis rot	creme; IIb	Laub- u Nadelb;
R. exalbicans/depallens 		4-12; weißl/rötl bis rot/olivlich	klebrig; glatt; glänzend; 1/2 abziehbar	F: weiß; scharf; etw fruchtig	L: ocker; S: weiß, oft rosa überhaucht	Fe rosa	ocker IIIa-c	ges Frk grauweiß ausblassend; Birken
[R. pseudointegra] 		3-12; rot/gelb/creme/weiß	trocken; matt; glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß; bitterlich- schärflich- kratzend; fruchtig	L: gelblich; S: weiß	Fe rosa; SV am Exs rot	blass gelb IVb	F jg sehr hart; Laubb (gerne Eichen)

Hut mehrfarbig, M, mild	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporen- pulver- farbe	Notizen
[R. aurora /velutipes] 		3-10; weiß/rot	klebrig/ glänz/glatt; 1/2 abziehbar	F: weiß; mild; geruchlos	L: weißlich; S: weiß	Fe rosa; SV am Exs rot	weißlich; Ib	Stiel oben netzartig- flockig; Laub- u Nadelb
R. ionochlora 		5-8; violett/lila/grau/ creme/ocker	klebrig/glänz/glatt; ½ abziehbar	F: weiß; mild (L jung pikant); geruchlos	L: creme; S: weiß	Fe intensiv orangerosa	hell creme; IIa	F unter der HH violett; Sp isol warzig; Laubb
R. aurea/aurata 		5-10; gelb/orange/rot	klebrig/glänz/glatt; 1/3 abziehbar	F: weiß, unter der Hh gelb ; mild; geruchlos	L: ocker, Schn goldgelb; S: weiß, oft z.T. gelb	Fe rosa	ocker bis blass gelb; IIIb-IVb	Laubb u Nadelb

<i>R. carpini</i> 		5-10; creme/grünlich/ rot/violett/gelb/braun	schleimig; glänzend; glatt; ½ abzieh	F: weiß; mild; geruchlos	L: dottergelb; S: weiß	Fe rosa	lebhaft gelb; IVd	Hainbuchen
Hut mehrfarbig, M, scharf bis bitter	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporen- pulver- farbe	Notizen
<i>R. fellea</i> 		4-10; gelb/Mitte honigorange	klebrig/glänz/ glatt; nicht abzieh	F: weiß; brennend scharf; fruchtig	L: ockerlich gelb; S: : ockerlich gelb	Fe äußerst schwach rosa	weiß; la	Rotbuchen
<i>R. atropurpurea</i> 		4-10; purpur- bis weinrot, Mitte fast schwarz	klebrig/ glänzend/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; mehr o weniger scharf; schwach fruchtig	L: weißlich; S: weiß	Fe rosa	weiß; la	Laub- und Nadelb (Eichen)
<i>R. atrorubens</i> 		3-7; rot bis violett, Mitte fast schwarz	klebrig/ glänzend/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; fruchtig	L+S: weiß	Fe rosa	weiß- weißlich; la-b	Nadelb; feuchte, saure Böden
<i>R. laccata</i> 		3-7; rot bis violett, grau, braun, ocker, grün, oliv, Mitte meist dunkler	klebrig/ glänzend/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; fruchtig	L+S: weiß	Fe rosa	weiß- weißlich; la-b	Weidearten (<i>Salix</i> sp.)
<i>R. luteotacta</i> 		3-7; weiß/rot	klebrig/glänz/ glatt; 1/3 abzieh	F: weiß; sehr scharf; schwach fruchtig	L+S: weiß, bei Liegenlassen stark gelb fleckend	Fe rosa	weiß- weißlich; la-b	L mitunter sehr entfernt; Laubb; Kalkböden
<i>R. fragilis</i> 		3-7; violett /grau/grün/ oliv, rötlich mit jeweils schwarzer Mitte	klebrig/glänz/ glatt; 1/2 abzieh	weiß; sehr scharf; schwach fruchtig	L+S: weiß	Fe rosa; NH3 negativ	weißlich; lb	Laub- und Nadelb (Eichen)
<i>R. queletii + fuscorubroides</i> 		3-9; grünl grau/ olivcreme/grünl gelb	klebrig/glänz/glatt; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; Stachelbeer- Kompott	L: hellcreme; S: rosa, weinrot, purpurn	Fe rosa; NH3 negativ	intensiv creme; IId	Nadelb; Kalkböden
<i>[R. sanguinea /sanguinaria]</i> 		3-10; weiß/creme/ rot	klebrig/matt glänz/glatt; n abzieh	F: weiß; scharf; geruchlos	L: hell ocker; S: weiß oder rot geflammt, gerne gilbend	Fe rosa	hell ocker; IIIa	L bogig, F dick; Nadelb (Kiefer)
<i>R. cavipes</i> 		3-8; rosa/violett/grau/grün	klebrig/glänz/ Rd gerieft; 1/2 abzieh	F: weiß; sehr scharf; intensiv fruchtig	L: hellcreme; S: weiß, gekammert hohl	Fe rosa; NH3 rosa	hell creme; IIa-b	Weißtannen; Kalkböden
<i>R. maculata</i> 		3-10; gelb bis orange/rot bis braun gefleckt	klebrig/glänzend/glatt ; wenig abzieh	F: weiß; scharf; fruchtig	L: buttergelb; S: weiß	Fe rosa	gelb; IVc	H meist punktförmig gefleckt; Laubb, Rotbuche, Eiche

Hut mehrfarbig, S, mild	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporen- pulver- farbe	Notizen
<u>R. versicolor</u> 		2-6; creme/oliv/rot /braun/ocker/grün	klebrig; glänzend; glatt; ½ abzieh	F: weiß; mild, geruchlos	L: ocker; S: weiß, Basis gilbend	Fe rosa	hellocker; IIIa-b	Birken ; heller Standort
<u>R. odorata</u> 		1,5-5; rötlich/braunl/ocker/ creme	klebrig/glänzend/ glatt; 2/3 abzieh	F: weiß, etw gilbend; mild; stark obstig	L: intensiv gelb; S: weiß, von Basis her gilbend	Fe rosa	gelb; IVb-c	Laubb (Eichen)
<u>R. risigallina/ chamaeleontina</u> 		1,5-6,5; rot bis orange/ Mitte gelb	klebrig/glänzend/ glatt; fast ganz abzieh	F: weiß; mild; frische Frk geruchlos, überreife Frk obstig	L: dottergelb; F:weiß	Fe rosa	intensiv gelb; IVd	Laub- u Nadelb
Hut mehrfarbig, S, scharf bis bitter	i d	Hut-Durchm in cm; Hutfarbe	Huthaut bei feuchter Witterung	F: Fleisch; Geschmack; Geruch	L: reife Lamellen; S: Stiel	Farb- Reaktionen	Sporen- pulver- farbe	Notizen
<u>R. pelargonica + R. violacea</u> 		2-5; violett/grün/ocker/gr au	klebrig; glänzend; glatt; ½ abzieh	F: weiß; scharf; nach Geranien o Obst	L: creme; S: weiß	Fe rosa	blass creme; IIa-b	fragile Arten; Laubb (Pappeln, Erlen, Eichen, Linden, Ulmen, Hainbuchen)
<u>R. versicolor</u> 		2-6; creme/oliv/rot /braun/ocker/grün	klebrig; glänzend; glatt; ½ abzieh	F: weiß; scharf, insbesondere Lamellen, geruchlos	L: ocker; S: weiß, Basis gilbend	Fe rosa	hellocker; IIIa-b	Birken ; heller Standort
<u>R. betularum</u> 		1,5-5,5; weiß bis creme/rot	klebrig/glänzend/glatt ; fast ganz abzieh	F: weiß; brennend scharf; geruchlos	L: hell creme; S: weiß	Fe rosa	weiß; la	Birke; feuchte, saure Böden