

Ich lasse hier noch die Beschreibung einer anderen neuen Sporormia folgen, die mir von Herrn Professor Passerini in Parma zugesandt wurde:

*Sporormia ulmicola* Passerini herb.

„*Peritherica semiimmersa subglobosa conico-papillata sparsa vel dense aggregata et tunc veluti stromate praedita; asci cylindrici clavati basi attenuati, 3-8 spori paraphysibus stipati, sporae 3-4 merae uniseriatae fuscae loculis guttulis.*“ In ligno Ulmi, Parmae.

Die Perithechien sind ca. 0,5–0,7 Mill. im Durchmesser; die Schläuche in einem ziemlich langen Stieltheil verschmälert, haben eine Länge von 190 Mikr., eine Breite von 21 Mikr., die Sporen messen 38 Mikr. in der Länge, 8 Mikr. in der Dicke. Die Art ist schon durch die Form der Schläuche vor den übrigen in den Grössen, Verhältnissen ihr nahekommenden Species mit 4gliedrigen Sporen: *Sp. intermedia*, Awd. (*Hedwigia*, VII. Bd., pag. 67) und *Sp. lageniformis* Fuckel (*Symb. mycol.*, pag. 242, *Fungi rhenani* 2270) ausgezeichnet. Letztere steht ihr jedenfalls am nächsten, doch sind die Perithechien derselben vollständig anders geformt. Es ist dies die zweite *Sporormia*-Art auf Holz. Fuckel's *Sporormia gigaspora* (vide Fuckel, *Symb. myc. Nachtr. I.*, p 37 (325), *Fungi rhenan.* 2364) ist durch die Grössen-Verhältnisse der Schläuche und Sporen, welch' letztere übrigens 8gliedrig sind, und durch vieles Andere leicht davon zu unterscheiden. Von der 8gliedrigen Form meiner *Sp. variabilis* unterscheidet sich *Sp. gigaspora* leicht durch die Perithechien und Schläuche.

Auch die Gattung *Delitzchia* kann ich um eine neue, sehr interessante Art vermehren. Herr Charles B. Plowright sandte mir kürzlich dieselbe, die er *Delitschia Winteri* benannte, und deren Veröffentlichung in diesen Blättern er mir freundlichst gestattete. Hier die Diagnose:

*Delitschia Winteri* Plowright in litt. ad me Peritheciis sparsis, immersis, globosis, atris, rugulosis, villo delicatissimo tenuissimo, hyalino vestitis, ca. 500 Mikr. diam., collo elongato — cylindraco, crassissimo (210 Mikr. crass.), apice abrupto, rugoso — tuberculato, saepe curvato geniculatove, perithecio aquante, emerso; ascis longe cylindraccis, brevissime pedicellatis, membrana apice gelatinose incrassata, jodo non coerulescente, ca. 460 Mikr. long., 38—52 Mikr. crass.; paraphysibus filiformibus, continuis, ascos brevioribus; sporidiis 8, monostichis, elongato-ellipticis, didymis, medio parum constrictis, maturis fusco-nigris, opacis, volva mucosa crassa circumdatis, 66—66 Mikr. long., 23 Mikr. crassis.